

Kvikne statsallmenning 2002-2007:			
År	Ryper/km2	90% sanns.	Kyllinger/høne
2002	46	33-65	5,1
2003	33	25-45	4,3
2004	32	24-42	5,5
2005	29	22-39	3,6
2006	16	11-23	4,3
2007	29	22-38	6,9

År	Statsallmenninga sør		Statsallmenninga nord	
	Ryper/km 2	Kyllinger/høne	Ryper/km 2	Kyllinger/høne
2008	11 (6-23)	2,7	22 (16-34)	3,2
2009	6 (4-11)	3,8	7 (4-10)	1,9
2010	7 (4-12)	3,8	6 (3-13)	8,3
2011	17(12-24)	8,6	24(18-32)	5,4
2012	7(4-11)	3,8	3(2-5)	3
2013	13(8-18)	3,6	16(11-24)	5,8
2014	17 (8-33)	4,1	24 (12- 48)	8,6
2015	16,6 (12-23)	2	7,9 (4,9-12,7)	2,1
2016	28 (21,4-36,6)	4,5	22,8 (13,4-39)	4,2
2017	48,6 (38,2-61,9)	5,5	37,3 (20,2-68,9)	5,1

Statsallmenninga samla		
Ryper/km2	90% sannsynlighet	Kyllinger/høne
16,5	11-28,5	2,95
6,5	4-10,0	2,85
6,5	3,5-12,5	6,05
20,5	15-28,0	7
5	3-8,0	3,4
14,5	9,5-21	4,7
20,5	10-40,5	6,35
12,25	9,35-17,85	2,05
25,4	22,1-37,8	4,35
42,95	29,2-65,4	5,3

Kvote

Kvote

Kvote

Fredning

Kvote

Kvote